

ISTRUZIONI PER LA PREMEDICAZIONE ALLE ALLERGIE AI FARMACI E IN PARTICOLARE AL MEZZO DI CONTRASTO (mdc) PER ESAMI TAC E RMN

La diagnosi certa di allergia a farmaci o a mezzi di contrasto, risulta estremamente difficile e non esistono test affidabili per la loro diagnosi.

Per tali motivi, ai pazienti che presentano una storia **di reazioni avverse a farmaci e mezzi di contrasto**, il medico radiologo valuterà una metodica alternativa di pari efficacia diagnostica che non necessiti di mezzo di contrasto.

Nel caso in cui non vi siano alternative viene suggerita la seguente preparazione con lo scopo di prevenire o limitare le eventuali reazioni attraverso una specifica desensibilizzazione.

E' necessario farsi prescrivere dal medico i farmaci sotto riportati.

Modalità di assunzione:

24 ORE PRIMA DELL'ESAME ASSUMERE:

- DELTACORTENE 25 mg 1 cp oppure MEDROL (metilprednisolone) 16 mg 1 cp.
- ZIRTEC (cetirizina) 10 mg 1 cp oppure AERIUS (desloratadina) 5 mg 1 cp o CLARITYN (loratadina) 10mg 1 cp.
- ZANTAC (ranitidina) 150 mg 1 cp.

12 ORE PRIMA DELL'ESAME ASSUMERE:

- DELTACORTENE 25 mg 1 cp oppure MEDROL (metilprednisolone) 16 mg 1 cp.
- ZIRTEC (cetirizina) 10 mg 1 cp oppure AERIUS (desloratadina) 5 mg 1 cp o CLARITYN (loratadina) 10mg 1 cp.
- ZANTAC (ranitidina) 150 mg 1 cp

2 ORE PRIMA DELL'ESAME ASSUMERE:

- DELTACORTENE 25 mg 1 cp oppure MEDROL (metilprednisolone) 16 mg 1 cp
- ZIRTEC (cetirizina) 10 mg 1 cp oppure AERIUS (desloratadina) 5 mg 1 cp o CLARITYN (loratadina) 10mg 1 cp .

Importante: presentarsi al Centro Medico 30 min prima dell'esame.